



โรคพิษสุนัขบ้า ติดต่อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

คนติดเชื้อจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด บ้วน เลียบาดแผล
สัตว์นำโรคที่พบมากที่สุด คือ สุนัข และแมว
หลังจากถูกกัด 3 สัปดาห์ ถึง 4 เดือน จะเริ่มแสดงอาการถ้ารับวัคซีนไม่ทัน



อาการในคน

“ลั่นหอย”
“น้ำลายไหล”

“กัดแกะสิ่งของ กัดกรง
อาจเชื่องซึม เสียงเห่าหอนเปลี่ยนไป”

“บ้วน คล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ”
“การเคี้ยว หรือกลืนผิดปกติ”

นอนนิ่งเป็นอัมพาต
และตายในที่สุด

อาการในสัตว์

“กระวนกระวาย”
“ตื่นเต้น ก้าวร้าว”

“ทรงตัวไม่ได้”



ป้องกัน 3 ขั้นตอน

1 ป้องกันสัตว์เป็นโรค

- พาสุนัขหรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่ออายุ 2-3 เดือน และฉีดซ้ำตามนัด
- ลดจำนวนสุนัข โดยการทำหมัน
- พบสัตว์สงสัย แจ้ง อสม. หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที



2 ป้องกันการถูกกัด

- เลี้ยงในบ้าน ใส่สายจูง ไม่ให้ไปกัดคนอื่น
- หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกกัด ด้วยคาถา 5 ย.

คาถา 5 ย. อย่าแหย อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง



3 ป้องกันหลังถูกกัด

ถ้าถูกสุนัขกัด บ้วน หรือเลียบาดแผลให้รีบปฏิบัติดังนี้



❗ ข้อห้ามในการดูแลบาดแผล

ห้ามถู หรือฟอกบาดแผลด้วยความรุนแรง

ห้ามใช้รองเท้าดี เพราะนอกจากบาดแผลจะเข้าเชื้อโรคอื่น ๆ ก็จะไปสู่บาดแผล

ห้ามทาครีมบริเวณบาดแผล

DDC 1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค



Get it on Google Play Download on the App Store

หากโดนสุนัข กัด ข่วน เลีย



✓ **รับล้างแผลให้สะอาด**
ด้วยน้ำและสบู่



✓ **กักสัตว์เลี้ยงเพื่อ**
เช็คว่าติดเชื้อหรือไม่



✓ **รับไปพบแพทย์**
ทันที



✓ **กรณีที่ได้รับวัคซีน**
ต้อง**ฉีดวัคซีนให้ครบตามแพทย์นัด**

นำสุนัขไปรับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เลี้ยงสุนัข
อย่างรับผิดชอบ



พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ครั้งแรก เมื่ออายุ 2-4 เดือน
และฉีดซ้ำทุกปี

✓ **เลี้ยงในบริเวณบ้าน**
อย่าปล่อยออก
นอกบ้านโดยไม่ดูแล
อาจเสี่ยงต่อการ
ถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ